



Indikationen

Kopf- und Halsbereich

- Migräne
- Zustand nach grippalem Infekt
- Chronischer Schleimhautkatarrh
- HWS-Syndrom
- Ödem nach Zahnextraktion
- Nervenschmerzen im Gesicht
- Gesichtsnerv-Lähmung
- Neck-Dissection

Im Brust-Rückenbereich

- BWS-Syndrom
- LSW-Syndrom
- Lumbalgie
- Ischialgie
- Ödem nach Rippenfraktur
- Verspannung

Im Arm- und Beinbereich

- Armlymphödem nach einer oder beidseitiger Brustamputation
- Armlymphödem bei primärer Fehlbildung der Lymphgefäße
- Sudeck'sche Dystrophie
- Ödem nach Knochenbrüchen
- Ödem nach Verstauchungen, Verrenkungen, ausgekugelten Gelenken
- Bluterguss
- Beinlymphödem nach Unterleibsoperation
- Beinlymphödem nach Genitaloperation
- Beinlymphödem bei primärer Fehlbildung der Lymphgefäße
- Beinödem bei venöser Insuffizienz (z.B. Krampfadern)
- Ödem nach Meniskusoperation
- Hüftarthrose
- Kniearthrose

Allgemeine auftretende oder generalisierte Ödeme – Rheumatische Ödeme

- Arthroseschub
- Muskelschmerzen
- Primäre chronische Polyarthrit
- Ödeme nach Operationen
- Ödeme nach Unfällen
- Hämatome
- Lipodystrophia dolorosa
- Multiple Sklerose
- Chronische Ekzeme
- Narben und Keloide
- Psoriasis